Hepar comp. Heel

Solución inyectable

Medicamento homeopático

Composición: 1 ampolla de 2,2 ml de solución inyectable contiene: Hepar suis D8, Cyanocobalaminum D4, Duodenum suis D10, Thymus suis D10, Colon suis D10, Vesica fellea suis D10, Pankreas suis D10, China D4, Lycopodium D4, Chelidonium D5, Carduus marianus D3, Histaminum D10, Sulfur D13, Avena sativa D6, Natrium diethyloxalaceticum D10, Acidum alpha-ketoglutaricum D10, Acidum DL-malicum D10, Acidum fumaricum D10, Acidum alpha-liponicum D8, Acidum oroticum D6, Calcium carbonicum Hahnemanni D28, Taraxacum D4, Cynara scolymus D6, Veratrum D4 ana 22 microlitros. Excipientes: agua para inyectables, cloruro de sodio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Caja conteniendo 5 o 50 ampollas de 2,2 ml de solución inyectable.

Titular:
Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: No debe utilizarse en personas cuya hipersensibilidad a Carduus marianus (Cardo mariano), o Taraxacum officinale (diente de león), o Cynara scolymus (alcachofas) o a otras compuestas es conocida. Al contener Chelidonium y Veratrum no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria.

Posología: En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c. o, en caso necesario, i.v.

-Heel

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: En casos raros, pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad como por ejemplo alergias cutáneas o fiebre después de tomar medicamentos que contienen quinina. En estos casos, deberá consultar con su médico. Aviso: Existe la posibilidad de una sensibilización a la quinina o la quinidina. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Apertura de las ampollas:



Punto coloreado hacia arriba
En caso de que se encuentre solución en la parte superior de la ampolla, dar unos ligeros golpes para que baje.



Abrir las ampollas tirando hacia atrás, es decir en dirección posterior al punto coloreado.