

Discus comp. Heel

Solución inyectable

Medicamento homeopático

Composición: 1 ampolla de 2,2 ml de solución inyectable contiene: Discus intervertebralis suis D8, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum D6, Riboflavinum D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Funiculus umbilicalis suis D10, Cartilago suis D8, Medulla ossis suis D10, Embryo suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Pulsatilla D6, Mercurius praecipitatus ruber D10, Sulfur D28, Cimicifuga D4, Ledum D4, Gnaphalium polycephalum D3, Colocynthis D4, Secale cornutum D6, Argentum D10, Zincum metallicum D10, Cuprum aceticum D6, Aesculus D6, Ranunculus bulbosus D4, Ammonium chloratum D8, China D4, Kalium carbonicum D6, Sepia D10, Acidum picirnicum D6, Berberis D4, Acidum silicicum D6, Calcium phosphoricum D10, Acidum alpha-liponicum D8, Natrium diethyloxalacetikum D6, Nadium D6, Coenzima A D10 ana 22 microlitros. Excipientes: agua para inyectables, cloruro de sodio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Caja conteniendo 5 o 50 ampollas de 2,2 ml de solución inyectable.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: No se han descrito.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. Advertencia: Existe la posibilidad de una sensibilización a la quinina o la quinidina.

-Heel


Posología: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m. o s.c.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso debe interrumpirse la administración del medicamento. En casos raros, pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad como por ejemplo alergias cutáneas o fiebre después de tomar medicamentos que contienen quinina. En estos casos, deberá consultar con su médico. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.


Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.


Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Apertura de las ampollas:



Punto coloreado hacia arriba

En caso de que se encuentre solución en la parte superior de la ampolla, dar unos ligeros golpes para que baje.



Abrir las ampollas tirando hacia atrás, es decir en dirección posterior al punto coloreado.