



068127/5002 GP

ES

# Bronchalis-Heel

## Comprimidos

Medicamento homeopático

**Composición:** 1 comprimido contiene: Belladonna D4, Sticta D4, Tartarus stibiatus D4, Creosotum D5, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4 ana 30 mg; Hyoscyamus D4, Bryonia D4 ana 60 mg. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Forma farmacéutica y contenido del envase:** Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

### Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.  
C/Madroño, s/n.  
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

### Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden-Baden, Alemania

**Contraindicaciones:** No se han descrito.

**Precauciones:** No se han descrito.

**Interacciones:** No se han descrito.

**Advertencias:** No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. Advertencia: si los síntomas persisten o tiene dificultad para respirar, fiebre o esputo purulento o sanguinolento, consulte al médico. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

**Posología:** Vía oral. En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

# -Heel






**Sobredosis:** Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

**Reacciones adversas:** Alergia al fenol. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

**Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**

