068100/5002 GP ES

Husteel

Gotas orales en solución

Medicamento homeopático

Composición: 100 g contienen: Arsenum jodatum D6, Belladonna D4, Scilla D4 ana 20 g; Cuprum aceticum D6 10 g; Causticum Hahnemanni D6 30 g. Excipiente: etanol 35% V/V. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase cuentagotas conteniendo 30 ml de gotas orales en solución.

Titular:
Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: En caso de afecciones de tiroides, no se debe utilizar sin consultar al médico.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Advertencias sobre excipientes: este medicamento contiene 35% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 140 mg/ 10 gotas, lo que equivale a 2,8 ml de cerveza o 1,2 ml de vino. Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

-Heel

Posología: Vía oral. En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de crisis de tos, varias veces 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.