

China-Homaccord S

Gotas orales en solución

Medicamento homeopático

Composición:

100 g contienen: China D2 0,6 g; China D10 0,6 g; China D30 0,6 g; China D200 0,6 g; Sepia D30 0,4 g; Sepia D200 0,4 g; Sepia D1000 0,4 g; Sepia D6 0,4 g. Excipiente: etanol 35% V/V. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase:

Envase cuentagotas conteniendo 30 ml o 100 ml de gotas orales en solución.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/ Madroño s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones:

No se han descrito.

Precauciones:

No se han descrito.

Interacciones:

No se han descrito.

Advertencias:

No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento.

-Heel

Advertencias sobre excipientes: este medicamento contiene 35% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 140 mg/ 10 gotas, lo que equivale a 2,8 ml de cerveza o 1,2 ml de vino. Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

Posología:

Vía oral. En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.

Sobredosis:

Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas:

En casos raros, pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo alergias cutáneas o fiebre, después de tomar medicamentos que contienen quinina. En estos casos, deberá consultar con su médico. Existe la posibilidad de una sensibilización a la quinina o la quinidina. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación:

Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE ♻ de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

-Heel