

Hepeel N

Solución inyectable

Medicamento homeopático

Composición: 1 ampolla de 1,1 ml de solución inyectable contiene: Lycopodium D2, Chelidonium D6, China D2, Nux moschata D3 ana 1,1 microlitros; Carduus marianus D1, Phosphorus D5 ana 0,55 microlitros; Veratrum D5 2,2 microlitros; Colocynthis D5 3,3 microlitros. Excipientes: agua para inyectables, cloruro de sodio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Caja conteniendo 5 ampollas de 1,1 ml de solución inyectable.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: Alergia conocida (hipersensibilidad) a alguna de las sustancias activas o excipientes.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Si usted tiene antecedentes de enfermedad hepática grave, consulte a su médico o farmacéutico.

-Heel



Posología: Vía i.m., s.c., i.d., i.v. Dosis estándar: Adultos y niños a partir de 12 años: 1 ampolla 1-3 veces por semana. Niños entre 2-5 años: ½ ampolla 1-3 veces por semana. Niños entre 6-11 años: ⅔ de una ampolla 1-3 veces por semana. En casos agudos: Adultos y niños a partir de 12 años: 1 ampolla diaria, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 2-5 años: ½ ampolla diaria, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 6-11 años: ⅔ de una ampolla diaria, y después se continúa con la dosis estándar.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: En casos aislados se pueden producir reacciones adversas, como reacciones alérgicas transitorias. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.


Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.


Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Apertura de las ampollas:



Punto coloreado hacia arriba

En caso de que se encuentre solución en la parte superior de la ampolla, dar unos ligeros golpes para que baje.



Abrir las ampollas tirando hacia atrás, es decir en dirección posterior al punto coloreado.

