



PZN- 0399054

075692 A2-12

ES

homeotox

125 cc jarabe vía oral
Medicamento homeopático

COMPOSICIÓN

100 g contienen: Thymus vulgaris D1 2,0 g; Drosera D1 1,0 g; Plantago major D1 1,0 g; Althaea officinalis D1 1,0 g; Echinacea angustifolia D1 1,0 g; Sticta pulmonaria D4 0,2 g; Bryonia D6 0,2 g; Cuprum aceticum D8 0,2 g; Cetraria islandica D4 0,2 g; Tartarus stibiatus D8 0,2 g; Coccus cacti D6 0,2 g. Excipientes: agua purificada, sacarosa, parahidroxibenzoato de metilo sal sódica (E-219), parahidroxibenzoato de propilo sal sódica (E-217), ácido cítrico, etanol (1,1 % V/V).

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frasco de 125 cc de jarabe.

TITULAR

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño s/n
28770 Colmenar Viejo, Madrid (España)

ELABORADO EN BÉLGICA POR

Heel Belgium
Industriepark Drongen
Booiebos 25
9031 Drongen

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Medicamento tradicionalmente utilizado para el alivio de la tos asociada a los catarros de las vías respiratorias.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a uno de los principios activos o los excipientes o a las plantas de la familia de las compuestas. Como

-Heel

-Heel



PZN- 0399054

norma general, no debe utilizarse en caso de enfermedades generalizadas progresivas como la tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, SIDA, infecciones por VIH y otras enfermedades autoinmunitarias.

PRECAUCIONES

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria.

Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento.

Advertencias sobre excipientes: Este medicamento contiene un 1,1 % de etanol (alcohol), esta pequeña cantidad se corresponde con 80 mg / 10 cc.

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este medicamento contiene 7,4 gramos de sacarosa por 10 cc. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene Parahidroxibenzoato de propilo sal de sódio y Parahidroxibenzoato de metilo sal de sódio.

POSOLOGÍA

Vía oral. Salvo criterio médico, la dosificación recomendada es de 2 cucharadas de 5 cc de 3 a 6 veces al día.

SOBREDOSIS

Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono: 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

En casos aislados pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad. Tras el tratamiento con medicamentos que contienen extractos de Echinacea, se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Consérvese en lugar fresco y seco.

No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE ☺ de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.